

► Még lehetnek fagyos éjszakáink, figyeljük a meteorológiai előrejelzéseket (lásd a 4. és a 7. felhívást).

A fagyok utáni regenerálásról pedig a Mezőhír hetilap április 16-i cikkéből másoltam ki az alábbiakat. A készítmények többségét mi is megvásárolhatjuk illetve más, hasonló hatóanyagúakkal helyettesíthetjük.

„**Fagyok utáni regenerálás.** Minden gyümölcsfánk meghálálja, ha a hidegbetörés után egy kis extra segítséget kap a kondíció javítására. Az első permetezést már 3–5 nappal a fagy után érdemes elvégezni – idén ez egy szeles és esős időszakra esett, nem feltétlenül sikerült kivitelezni –, majd 10–14 nap múlva ismételni.

Néhány példa az alkalmazható készítményekre:

- Aminosavak és algakivonatok (pl. Amalgerol, FitoHorm Turbo-K, FitoHorm Alga 600, Wuxal Amino) segítenek a stressz oldásában és a fehérjeszintézis újraindításában.
- Kalcium és bór: a sejtfalak erősítésére és a rügydifferenciálódás serkentésére (pl. Damisol Gold Kalcium-Bór vagy a YaraVita Rexene BZn).
- Magnézium- és mikroelem-pótlás a fotoszintézis és az anyagcsere serkentésére (pl. Wuxal Microplant vagy FitoHorm Komplex).
- Biostimulátorok alkalmazása, amelyek fokozzák a növény életteni folyamatait, segítik a tápanyag-felvételt és -hasznosítást (pl. Atonik, Megafol, Kelpak, Humin Garden, TerraVital termékcsalád).”

► Ahol már biztosan látjuk, hogy nem lesz termésünk, ott se hagyjuk magukra a fákat. Nyár végén alakulnak ki a következő évi termőrügyek és ekkor tölti fel a növény a hajtásokat, a rügyeket azokkal az anyagokkal melyek a fagyvédelem szempontjából is alapvetőek. **Meg kell tartanunk az egészséges lombot!** Mi az, amire akkor is oda kell figyelnünk, ha nincs termésünk az adott évben? – teszi fel a kérdést Pálné dr. Harcsa Marietta a [Gyümölcsfák védelme nem termő éveken](#). cikkében. Érdemes elolvasni!

► Az almafa beteg rügyeiből kipattant fertőzött levélkékről a lisztharmat már tovább terjedt és az egészségesen kibújt leveleket is megfertőzte a gomba (a fotón az alsó levél foltjai). Ennél az időjárásnál a varasodásra is számítanunk kell, a körténél is. **Általában a virágzás után szoktuk indítani a felszívódó (szisztemikus) gombaölőket.** Ekkor már nagyok a levelek, nagy a felszívódást biztosító lombfelület. A diónyi termésmagyságig, a gyümölcs viaszosodásáig a rézzel különben is vigyázni kell, mert megperzselheti a kis gyümölcsöket. Varasodásra és a lisztharmatra is bevethetők pl. a difenokonazol, a pentiopirad, a penkonazol hatóanyagokból készültek. A ciflufenamid hatóanyagúak csak lisztharmatra, a ciprodinilből készültek csak varasodásra engedélyezettek. Ezek között III. kategóriásokat is találunk, lásd a [hatóanyag abc 2025.pdf-ben](#). A felszívódó készítményekkel szemben a gombákban kialakulhat a **rezisztencia**. Ezért időnként kontakt szerekre kell váltanunk, vagy egyből keverjük be ezeket a felszívódók mellé. A varasodás ellen rézzel, metirammal, a lisztharmat ellen pedig valamelyik kontakt kéntartalmú szerrel egészíthetjük ki a felszívódós permetlevet. Az itt szóba jövő **egyszerű anyagokat** a 6. felhívásban felsoroltam és a kálium-hidrogén-karbonátról is írtam. Narancsolajból is készültek lisztharmat elleni készítmények.



► Egyetlen ép levél sincs a fotózott **tafrinás nektarinon**. A legfrissebb csúcsi levelek is hólyagosak, kb. 1-2 hete történhetett a fertőzés. A veszély nem szűnt meg, apró esőket és 10-20 °C közötti hőmérsékletet [jósolnak](#). A védekezésről az 5. felhívásban írtam.

Inkább csak ijesztő a **levélpirosító ribiszke-levéltetű** kárképe. A tetvek júniusban különben is elhagyják a ribizlit. Októberben petézni repülnek vissza a megtermékenyített „tetűlányok”. Ezek a tojások telelnek át. Olajos lemosással gyéríthetjük őket. Mindhárom fénykép ma készült.

Budapest, 2025. április 22.

Jó egészséget Önöknek és a növényeiknek is:

Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a fent megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és szaktanácsot is kaphatnak a növényvédelmi végzettségű eladóktól!