

► Az országos csapdahálózatunk legtöbb pontján [rajzanak a cseresznyelegek](#), a hetente frissülő táblázatunkban a könnyebb követhetőség kedvéért késsel jelöltem a fogási számokat. Ismét kiemelem, hogy igazán pontosan mindenki csak a saját kertjében kifüggesztett sárgalappal követheti a legyek rajzását. Több forrásból is beszerezhetik az eszközöket. A [Reagron csapdacsaládban](#) is megtalálható, mi az idén a csalomoncsapdak.hu [webshopjából](#) rendeltünk az [akasztójával](#) együtt. Ez utóbbira azért lehet szükség, mert a talajból kibújó legyek először a fa tetején lévő termést keresik fel. Ha a sárgalapokat a fa tetejére tudják kiakasztani pl. ezzel az egyszerű akasztóval, akkor már ezeket a legkorábban kikelő legyeket is elcsíphetik és időben kezdek a permetezést. Persze a létrázás vagy a csiga használata is szóba jöhet. A kényelmesen elérhető pl. mellmagasságban kiakasztott lapokon lehet, hogy csak két hét múlva jelennek meg az első legyek. Ekkor a korábban kirajzók már „beköpték” a fa tetején érő termést. A Reagron oldalán látható grafikon a néhány éve megjelent és azóta elterjedt keleti cseresznyelegek rajzásmentét is bemutatja (a szaggatott vonal). Sajnos már ennek a fajnak a károsításával is számolnunk kell, tovább tart a rajzása, a kései meggyekben is kárt tehet.

Több készítménnyel is védekezhetünk ellene. A piretroid hatóanyagúak **kontaktak** (érintőlegesek), ezekkel ismételni kell a kezelést és a teljes fát le kell fedni a permetlével. Ilyen a deltametrin (pl. Decis és még 24 készítmény), a lambda-cihalotrin (pl. Karate Zeon 15 CS, Kaiso Garden, Lamdex Extra), stb. **Felszívódik** a növénybe az acetamiprid (pl. Mospilan és még 24 névváltozatban) belülről védi a növényt.

A cseresznye gyors érése miatt fokozottan figyelni kell a várakozási időkre (é.v.i.). A lambda-cihalotrint tartalmazóknál 3 nap után, a Decisnél és a Mospilan 20 SG-nél is (!!!) 7 nap múlva lehet a permetezés után szüretelni. A felsorolt rovarölő szerek más néven is kaphatóak, lásd a [hatóanyag abc 2025.pdf-ben](#).

► A „testvérénél”, a nyugati dióburok fúrólégynél már bevált csalogatóanyag technológia itt is alkalmazható. A peterakás előtt fehérjetartalmú anyagokkal kell táplálkoznia a legyeknek. A **Combi-protec csalétekben** lévő fehérje vonzza a legyeket. A csalétekkel együtt a bekevert rovarölő szert is benyalják. Mivel a piretroidok riasztó hatásúak a rovarokra, ezért ezekkel nem keverhető a Combi protec. Gomba ölőkkel és tapadásfokozó készítményekkel sem kombinálható. A III. kategóriások közül tehát az acetamipridet tartalmazók jöhetnek szóba pl. a Mospilan 20 SG. Fontos a technológia betartása, Jáger Ferenc előadásából emelek ki két részletet.

Először törzsoldat készítése (nem önthető közvetlenül tartályba)

- 1. langyos víz az edénybe
 - 2. Combi-protec (víz: CP 1:1), azonnali keveréssel.
 - 3. az elkevert anyaghoz adni rovarölőszert.
- Az oldódás optimális hőmérséklete min. 20 °C

- Permetezés 10- (14) naponta
- Eső után a kezelést meg kell ismételni!
- Adagolás 20 liter permetléhez:
 - 5 db „leveles” (4 g-os) Mospilan
 - 0,5 liter Combi Protec
 - 20 liter permetlé kb. 70-100 kifejlett, termőkorú fa permetezéséhez elegendő

Talán ez az utolsó sor a legfurcsább számunkra: 20 literrel 70-100 fát lel lehet permetezni? Nem tévedés, ugyanis elegendő csak lefröcskölni a fa lombkoronájának egy részét, a lassan beszáradó, durva méretű cseppekkel, melyek lassan száradnak be és épp ezért hosszan vonzzák a legyeket. Engedélykirata külön is megemlíti a házikerteket. Mellékelem. **Jó hír, hogy már 0,1 literesben is kapható.**

► A csalogató eljárásra még visszautalok, mert a nyugati dióburok-fúrólégynél is alkalmazható. A maradék sárgalapot is át lehet akasztani a diófára. Ugyanaz a szín és illatpárna csalogatja őket is.

► Védekezhetünk még pl. az **egyszerű anyagok** közül a diammonium foszfáttal. Rasztik Viktória szerint a varádics és a fehérürömetával illatfedést érhetünk el és ez is hatásos. A [korai fajtákat](#) már a légy rajzása előtt leszűreteljük, válasszunk ilyen fajtát ha permetezés nélküli termést szeretnénk. Kisebb fáknál állítólag bevált az is, ha több sárgalapot akasztanak ki a fára. A négy oldalára, méterenként egyet. Ez a színburok összezavarhatja a legyeket. Befőzéskor az áztatással is kicsalogathatóak. Szerintem az is jó módszer, ha csak egyszerűen bekapjuk a szemeket. Nem nézzük meg, hogy mozog-e bennük valami. 😊

Budapest, 2025. május 19.

Jó egészséget Önöknek és a növényeiknek is:

Zsigó György, NMNK

A [Hermes ÁFÉSZ](#) üzleteiben a fent megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és szaktanácsot is kaphatnak a növényvédelmi végzettségű eladóktól!